

PBS150®

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content 24,4% by mass

Ingredients:

Ethylene oxide-propylene oxide copolymers (CAS: 9003-11-6)¹
Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Fairways, Tees, and Sports Turf

100 Day Moisture Management: Apply two applications 15 days apart at 16 L/ha in 800 L of water (5 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply 90 to 100 days after last treatment or as needed.

150 Day Moisture Management: Apply three applications 15 days apart at 16 L/ha in 800 L of water (5 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply 120 to 150 days after last treatment or as needed.

Bunker Faces, Collars, Roughs, and Lawns

Apply two applications 7 to 10 days apart at 25 L/ha in 800 L of water (8 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply after 120 to 150 days or as needed.

Irrigate with sufficient water to deliver PBS150 to the soil profile - 3 mm (1/8 inch) or more recommended.

DO NOT combine PBS150 in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

MADE IN USA

CE



NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,40 kg (22,93 lbs)

1,040 kg/l at 20° C
(8,679 lbs/US gal at 68° F)

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Anorganische bodemverbeteraar

NL

Drogestofgehalte 24,4% naar massa

Ingrediënten:

Ethyleenoxide-propyleenoxide-copolymeren (CAS: 9003-11-6)¹ waarbij ¹ CMC
1 primaire materiaalstoffen en -mengsels

GEBRUIKSAANWIJZING

Fairways, Tees en Sportvelden

100-dagen vochtbeheer: Twee toepassingen uitvoeren met een interval van 15 dagen bij 16 L/ha in 800 L water. Opnieuw toepassen 90 tot 100 dagen na de laatste behandeling of indien nodig.

150-dagen vochtbeheer: Drie toepassingen uitvoeren met een interval van 15 dagen bij 16 L/ha in 800 L water. Opnieuw toepassen 120 tot 150 dagen na de laatste behandeling of indien nodig.

Bunkerwanden, Randen, Roughs en Gazons

Twee toepassingen uitvoeren met een interval van 7 tot 10 dagen bij 25 L/ha in 800 L water. Herhalen na 120 tot 150 dagen of indien nodig.

Beregenen met voldoende water om PBS150 in het bodemprofiel te brengen – minimaal 3 mm aanbevolen.

PBS150 NIET in de spuitkant mengen met pesticiden of meststoffen, tenzij eerder gebruik heeft aangetoond dat de combinatie fysisch compatibel, effectief en niet schadelijk is onder lokale omstandigheden.

OPSLAG EN VERWIJDERING

Bewaar goed gesloten op een droge plaats, bij een temperatuur boven 5 °C en beschermd tegen zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten. Uitsluitend opslaan in de originele verpakking. Spoor de verpakking driemaal uit en giet het speelwater in de spuitkant. Voer de verpakking driemaal uit en giet het speelwater in de spuitkant. Verwijder lege verpakkingen overeenkomstig geldende wetgeving.

GEVARENAANDUIDING(EN)

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Geen bekende significante effecten of kritische gevaren.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Etiket lezen vóór gebruik. Bij contact met de ogen de ogen met water spoelen. Bij inslikken water of melk geven. Bij oog- of huidirritatie of indien u zich onwel voelt, medisch advies inwinnen.

NETTO-INHOUD
10 liter

NETTOGEWICHT
10,40 kg

Geïmporteerd door:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

PFC 3B – Améliorant de sol inorganique

FR

Teneur en matière sèche 24,4% en masse

Ingédients:

copolymères d'oxyde d'éthylène-oxyde de propylène (CAS : 9003-11-6)¹ où ¹ CMC 1 substances et mélanges de matières vierges

MODE D'EMPLOI

Fairways, Départs et Gazons de Sport

Gestion de l'humidité sur 100 jours: Appliquer deux applications de 16l/ha dans 800L d'eau à des intervalles de 15 jours. Réappliquer 90 à 100 jours après le dernier traitement ou selon les besoins.

Gestion de l'humidité sur 150 jours : Appliquer trois de 16l/ha dans 800L d'eau à des intervalles de 15 jours. Réappliquer 120 à 150 jours après le dernier traitement ou selon les besoins.

Parois de Bunkers, Colerettes, Roughs et Pelouses

Appliquer 25 L/ha dans 800 L d'eau à des intervalles de 7 de 10 jours ou selon les besoins. Réappliquer après 120 à 150 jours ou selon les besoins.

Irriguer avec suffisamment d'eau pour amener PBS150 dans le profil du sol – 3 mm ou plus recommandés.

NE PAS combiner PBS150 dans la cuve de pulvérisation avec des pesticides ou des engrais, sauf si une utilisation antérieure a démontré que la combinaison est physiquement compatible, efficace et non dommageable dans les conditions locales.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

À conserver fermé dans un endroit sec à une température supérieure à 5 °C et à l'abri de la lumière du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Rincer le récipient trois fois et verser l'eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation ou le réservoir de préparation. Éliminer les récipients vides conformément aux lois applicables.

DÉCLARATIONS DE DANGER

Le produit n'est pas classé comme dangereux. Aucun effet significatif ni danger critique connu.

CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. En cas d'ingestion, donner de l'eau ou du lait. En cas d'irritation des yeux ou de la peau ou en cas de malaise, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux.

CONTENU NET
10 liter

POIDS NET
10,40 kg

Importé par:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Anorganischer Bodenverbesserer

DE

Trockensubstanzgehalt. 24,4 % Massenprozent

Bestandteile:

Ethylenoxid-Propylenoxid-Copolymere (CAS: 9003-11-6)¹ wobei ¹ CMC 1
Primärmaterialstoffe und -gemische

ANWENDUNGSHINWEISE

Fairways, Abschläge und Sportrasen

100-Tage Feuchtigkeitsmanagement: Zwei Anwendungen im Abstand von 15 Tagen mit 16 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar. Wiederholung nach 90 bis 100 Tagen oder nach Bedarf.

150-Tage-Feuchtigkeitsmanagement: Drei Anwendungen im Abstand von 15 Tagen mit 16 l/ha. Wiederholung nach 120 bis 150 Tagen oder nach Bedarf.

Bunkerböschungen, Vorgrüns, Roughs und Rasenflächen

Zwei Anwendungen im Abstand von 7 bis 10 Tagen mit 25 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar. Wiederholung nach 120 bis 150 Tagen oder nach Bedarf. Anschließend mit mindestens 3 mm Wasser einwässern.

Mit ausreichend Wasser einregnen, um PBS150 in das Bodenprofil zu transportieren – mindestens 3 mm empfohlen.

PBS150 NICHT im Spritztank mit Pestiziden oder anderen Düngemitteln mischen, es sei denn, frühere Anwendungen haben gezeigt, dass die Kombination unter lokalen Bedingungen physikalisch kompatibel, wirksam und nicht schädlich ist.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Geschlossen an einem trockenen Ort über 5 °C und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Behälter stets verschlossen halten. Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dreimal ausspülen und Spülwasser in den Spritz- oder Vorratstank geben. Leere Behälter gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

GEFAHRENHINWEISE

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Keine bekannten wesentlichen Auswirkungen oder kritischen Gefahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Etikett vor Gebrauch lesen. Bei Augenkontakt die Augen mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken Wasser oder Milch trinken. Bei anhaltenden Augen- und Hautreizungen oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

NETTOINHALT
10 liter

NETTOGEWICHT
10,40 kg

Importiert von:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

PFC 3B - Ammendante inorganico del suolo

IT

Contenuto di sostanza secca 24,4% in massa

Ingredienti:

copolimeri di ossido di etilene-ossido di propilene (CAS: 9003-11-6)¹ dove ¹ CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini

ISTRUZIONI PER L'USO

Fairway, Tee e Tappeti Erbosi Sportivi

Gestione dell'umidità a 100 giorni: Applicare due applicazioni a distanza di 15 giorni alla dose di 16 l/ha in 800 l di acqua. Riapplicare da 90 a 100 giorni dopo l'ultimo trattamento o secondo necessità.

Gestione dell'umidità a 150 giorni: Applicare tre applicazioni a distanza di 15 giorni alla dose di 16 l/ha in 800 l di acqua. Riapplicare da 120 a 150 giorni dopo l'ultimo trattamento o secondo necessità.

Facce dei Bunker, Collettere, Rough e Prati

Applicare due applicazioni a distanza di 7–10 giorni alla dose di 25 l/ha in 800 l di acqua. Riapplicare dopo 120–150 giorni o secondo necessità.

Irrigare con una quantità d'acqua sufficiente per portare PBS150 nel profilo del suolo – si raccomandano 3 mm o più.

NON combinare PBS150 nella botte di irrorazione con pesticidi o fertilizzanti, salvo che un uso precedente abbia dimostrato che la combinazione è fisicamente compatibile, efficace e non dannosa nelle condizioni locali.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in un luogo asciutto e ben chiuso, a temperatura superiore a 5 °C, al riparo dalla luce solare. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare esclusivamente nel contenitore originale. Risciacquare il contenitore tre volte e versare l'acqua di risciacquo nel serbatoio di irrorazione o nel serbatoio di preparazione. Smaltire i contenitori vuoti in conformità alle leggi applicabili.

DICHIARAZIONI DI PERICOLO

Il prodotto non è classificato come pericoloso. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

DICHIARAZIONI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua. In caso di ingestione, somministrare acqua o latte. In caso di irritazione agli occhi o alla pelle o se ci si sente indisposti, consultare un medico/richiedere assistenza medica.

CONTENUTO NETTO
10 litri (2,64 galloni USA)

PESO NETTO
10,40 kg (22,93 lbs)

Importato da:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Melhorador inorgânico do solo

PT

Teor de matéria seca24,4 % em massa

Ingredientes:

Copolímeros de óxido de etileno-óxido de propileno (CAS: 9003-11-6)¹ onde ¹ onde ¹
CMC 1 substâncias e misturas de materiais virgens

INSTRUÇÕES DE USO

Fairways, Tees e Relvados Desportivos

Gestão da humidade a 100 dias: Aplicar duas aplicações com intervalo de 15 dias a 16 L/ha em 800 L de água (5 onças por 1.000 ft² em 2 galões). Reaplicar 90 a 100 dias após o último tratamento ou conforme necessário.

Gestão da humidade a 150 dias: Aplicar três aplicações com intervalo de 15 dias a 16 L/ha em 800 L de água (5 onças por 1.000 ft² em 2 galões). Reaplicar 120 a 150 dias após o último tratamento ou conforme necessário.

Fases de bunkers, colarinhos, roughs e relvados

Aplicar duas aplicações com intervalo de 7 a 10 dias a 25 L/ha em 800 L de água (8 onças por 1.000 ft² em 2 galões). Reaplicar após 120 a 150 dias ou conforme necessário.

Irrigar com água suficiente para levar o PBS150 ao perfil do solo – recomendam-se 3 mm (1/8 de polegada) ou mais.

NÃO combinar o PBS150 no tanque de pulverização com pesticidas ou fertilizantes, salvo se o uso anterior tiver demonstrado que a combinação é fisicamente compatível, eficaz e não prejudicial nas condições locais.

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

Conservar em local seco e fechado, acima de 5 °C, ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar apenas no recipiente original. Enxaguar o recipiente três vezes e despejar a água de enxágamo no tanque de pulverização ou no tanque de preparação. Eliminar os recipientes vazios de acordo com a legislação aplicável.

DECLARAÇÕES DE PERIGO

O produto não é classificado como perigoso. Não são conhecidos efeitos significativos nem perigos críticos.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes de usar. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água. Em caso de ingestão, dar água ou leite. Se ocorrer irritação ocular ou cutânea ou se se sentir indisposto, procurar aconselhamento/assistência médica.

CONTEÚDO LÍQUIDO
10 litros (2,64 galões US)

PESO LÍQUIDO
10,40 kg (22,93 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

PFC 3B – Mejorador inorgánico del suelo

ES

Contenido de materia seca 24,4% en massa

Ingredientes:

Copolímeros de óxido de etileno-óxido de propileno (CAS: 9003-11-6)¹ donde ¹ donde ¹
CMC 1 sustancias y mezclas de materiales vírgenes

INSTRUCCIONES DE USO

Fairways, Tees y Césped Deportivo

Gestión de la humedad a 100 días: Aplicar dos aplicaciones con 15 días de intervalo a 16 L/ha en 800 L de agua (5 onzas por 1.000 ft² en 2 galones). Reaplicar entre 90 y 100 días después del último tratamiento o según sea necesario.

Gestión de la humedad a 150 días: Aplicar tres aplicaciones con 15 días de intervalo a 16 L/ha en 800 L de agua (5 onzas por 1.000 ft² en 2 galones). Reaplicar entre 120 y 150 días después del último tratamiento o según sea necesario.

Caras de Bunker, Collares, Roughs y Céspedes

Aplicar dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días a 25 L/ha en 800 L de agua (8 onzas por 1.000 ft² en 2 galones). Reaplicar después de 120 a 150 días o según sea necesario.

Irrigar con suficiente agua para llevar PBS150 al perfil del suelo – se recomiendan 3 mm (1/8 de pulgada) o más.

NO combinar PBS150 en el tanque de pulverización con pesticidas o fertilizantes, salvo que un uso previo haya demostrado que la combinación es físicamente compatible, eficaz y no perjudicial bajo las condiciones locales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar cerrado en un lugar seco a una temperatura superior a 5 °C, protegido de la luz solar. Mantener el envase bien cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Enjuagar el envase tres veces y verter el agua de enjuague en el tanque de pulverización o en el tanque de preparación. Eliminar los envases vacíos de acuerdo con las leyes aplicables.

INDICACIONES DE PELIGRO

El producto no está clasificado como peligroso. No se conocen efectos significativos ni peligros críticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua. En caso de ingestión, dar agua o leche. Si se produce irritación ocular o cutánea o si se siente mal, consulte a un médico/obtenga atención médica.

CONTENIDO NETO
10 litros (2,64 galones US)

PESO NETO
10,40 kg (22,93 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

PBS150®

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content 24,4% by mass

Ingredients:

Ethylene oxide-propylene oxide copolymers (CAS: 9003-11-6)¹

Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Fairways, Tees, and Sports Turf

100 Day Moisture Management: Apply two applications 15 days apart at 16 L/ha in 800 L of water (5 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply 90 to 100 days after last treatment or as needed.

150 Day Moisture Management: Apply three applications 15 days apart at 16 L/ha in 800 L of water (5 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply 120 to 150 days after last treatment or as needed.

Bunker Faces, Collars, Roughs, and Lawns

Apply two applications 7 to 10 days apart at 25 L/ha in 800 L of water (8 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply after 120 to 150 days or as needed.

Irrigate with sufficient water to deliver PBS150 to the soil profile - 3 mm (1/8 inch) or more recommended.

DO NOT combine PBS150 in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

MADE IN USA

CE

NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,40 kg (22,93 lbs)

1,040 kg/l at 20° C
(8,679 lbs/US gal at 68° F)

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



 **AQUA·AID**
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM